

Preparación para EGD / Bravo – CON Medicamentos

Estas son las instrucciones específicas de su médico. Por favor, sígalas con cuidado para asegurar una **preparación exitosa**. Si usted tiene alguna pregunta sobre su preparación, por favor llame a nuestra oficina o visite nuestra página web:

- <https://www.gigeorgia.com/prep/>
- Usted puede contactar el consultorio del médico al número: **678.741.5000**

Notas Especiales: Si usted tiene un problema importante de corazón o pulmón, u otros problemas de salud mayores, por favor hable de esto con el anestesta en el centro. Por favor, contáctelos lo antes posible llamando a su centro asignado.

2550 Windy Hill Rd., Suite 302, Marietta (770-226-9070) | 118 Mill St., Suite 100, Woodstock (678-819-4281)
880 Crestmark Dr., Suite 102, Lithia Springs (678-388-2040)

7 días antes del procedimiento	1 día antes del procedimiento	Día del procedimiento
Revise TODAS las instrucciones de preparación minuciosamente. Por favor, revise sus medicamentos para detectar cualquier anticoagulante (ejemplos enumerados a continuación) Plavix, Warfarina/Coumadin, Eliquis, Brilinta, Xarelto, Effient, Aggrenox, Pradaxa y otros. Por favor, deje todos estos tal como se le indicó. Si no ha recibido instrucciones para gestionar estos medicamentos, contáctanos inmediatamente. DEJE de tomar los siguientes 7 Días antes del examen: • Suplemento de hierro/multivitámico con hierro • Medicamento GLP-1 para la Diabetes/Pérdida de Peso (esto incluye Ozempic, Mounjaro, Trulicity, Zepbound, etc.) • Fentermina para la Pérdida de Peso DEJE de tomar los siguientes 3 días antes del examen: • Medicamentos SGLT-2 para la Diabetes: Invokana, Farxiga, Jardiance, etc. Estos medicamentos pueden afectar la calidad y seguridad del procedimiento y la sedación. No seguir estas instrucciones puede provocar retrasos o cancelaciones del procedimiento.	Si está tomando medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso/diabetes (Ozempic, Mounjaro, Trulicity, etc.), entonces debes seguir una dieta LÍQUIDA CLARA por TODO el día antes del examen. • Si usted NO toma de estos, entonces puede comer normalmente el día antes del examen, pero mantener una comida ligera en la noche. DEJE de tomar los siguientes 1 día antes del examen: • Medicamentos estimulantes del SNC para el TDAH: Adderall, Ritalin, Concerta, Vyvanse, etc. NO COMA NADA DESPUÉS DE MEDIANOCHE, hasta después del examen. Si usted toma insulina <u>de acción prolongada</u>, tome solo la mitad de la dosis la noche anterior al procedimiento. Confirme que tiene a un conductor para el examen. ¡SIN CONDUCTOR significa que NO HAY PROCEDIMIENTO!	NO COMA ALIMENTOS SÓLIDOS, pero puede consumir líquidos claros hasta 3 HORAS antes del examen. Consulte los detalles de la Dieta Líquida Clara a continuación. NADA DE GOMA DE MASCAR, CONFITES DUROS NI TABACO DE MASCAR hasta después del examen. No tome insulina ni medicamentos para la diabetes la mañana del procedimiento, a menos que se lo instruya su proveedor. Está bien tomar los medicamentos recetados con un pequeño sorbo de agua (excepto la insulina y otros medicamentos para la diabetes), pero tómelos al menos 3 horas antes del procedimiento. El consumo de drogas ilícitas, marihuana/THC, el día de su procedimiento resultará en cancelación y honorarios.

***Detalles de la Dieta Líquida Clara:**
SIN LÁCTEOS, NADA ROJO, MORADO ni ANARANJADO.

Aprobado

Sodas, café, té
Jugos claros, aguas "fitness"
Caldo de pollo, vegetal y res
Gelatina/Jello
Paletas sin pulpa

Evada

Nada de leche/lácteos
Nada de jugos con pulpa
NADA ROJO, MORADO NI NARANJA.



ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Revise este video corto, animado de instrucciones de Bravo en:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=1p-WsNwiW4&feature=youtu.be>

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- **EN EL DÍA** de su procedimiento **NO CONSUMA** comida, goma de mascar, confites duros ni tabaco hasta que se complete el procedimiento.
- **Se le permite una dieta líquida clara hasta 3 horas antes del procedimiento.**
- **Cuando esté dentro de las 3 horas antes de su procedimiento, NO tome nada por vía oral.**
- Si se le ha instruido que se ponga inyecciones de Lovenox, no se las ponga en la mañana del procedimiento, a menos que se le indique lo contrario.
- **EXCEPCIÓN:** Si hay medicamentos recetados que usted **NECESITA** tomar en la mañana del procedimiento, hágalo con un pequeño sorbo de agua **AL MENOS 3 horas antes** del procedimiento. No tome **nada** por vía oral a partir de 3 horas antes del procedimiento.
- **DIABÉTICOS:** No tome **NADA** de insulina ni medicamento oral para la diabetes en la mañana del procedimiento, a menos que su gastroenterólogo le indique lo contrario.
- Si usa un inhalador, tráigalo consigo a su procedimiento.
- Si usa lentes de contacto, prepárese para quitárselos o use anteojos en su lugar.
- Por favor, no traiga joyería (incluyendo los piercings corporales) ni use loción en el centro.
- **NO USE DROGAS ILÍCITAS, INCLUYENDO MARIHUANA/THC, EN EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO. SI LO HACE, SU PROCEDIMIENTO SERÁ CANCELADO E INCURRIRÁ EN TARIFAS DE CANCELACIÓN.**
- Planee estar en el centro por 3 a 4 horas.

Este procedimiento requiere de sedación. Por lo tanto, un conductor (**de 18 años o mayor**) debe acompañarlo a su cita. La persona que lo conduzca a casa **debe permanecer en el centro** mientras se realiza el procedimiento para que esté disponible para recibir instrucciones de alta e información médica pertinente, así como posiblemente ayudarlo a vestirse. Usted no puede ir a casa en taxi, en transporte compartido (Uber/Lyft) ni en transporte público. La sedación que usted recibirá le impedirá conducir con seguridad o trabajar el resto del día del procedimiento. Seguido de su procedimiento, no conduzca, no maneje maquinaria pesada ni firme documentos legales por 24 horas.

SIN CONDUCTOR = NO HAY PROCEDIMIENTO

Si usted tiene alguna pregunta o preocupación sobre la preparación, por favor contacte a su coordinador de programación de procedimientos llamando al 678.741.50000 o visitando nuestra página web en la dirección <https://www.gigeorgia.com/prep/>