

Estudio de motilidad / manometría

A continuación se indican las instrucciones para su procedimiento. Por favor, sígalas cuidadosamente.

1. Podrá manejar usted mismo(a) de regreso a casa después del estudio.
2. Si su estudio está programado por la mañana, no coma ni beba nada después de la medianoche.
3. Si su estudio está programado por la tarde, puede tomar líquidos hasta las 8:00 a.m., y después no coma ni beba nada hasta terminar su cita.
4. Deberá permanecer aproximadamente de 1 – 2 horas para completar la prueba.
5. Si tiene preguntas, por favor comuníquese con alguna de las ubicaciones que se indican a continuación.

Instrucciones sobre medicamentos:

1. No tome los siguientes medicamentos 24 horas antes del estudio:
 - a. Bentyl, Donnatel, Probanthine, Reglan o Urecholine
2. Todos los demás medicamentos, como los de presión arterial o para el corazón, puede tomarlos como de costumbre.

Qué puede esperar:

Se colocará un tubito pequeño y flexible por la nariz hasta el estómago. Este tubo no afectará su respiración. Está diseñado para medir la presión en distintas partes del esófago (conducto por donde pasa la comida). Durante el estudio, se le pedirá que tome pequeños sorbos de agua. Los resultados se registran en papel y se entregan a su médico para su interpretación.

Si tiene más preguntas, por favor comuníquese con la sede donde está programado su estudio:

Laboratorio GI de Cobb - Melissa Krause (470) 732-3873

Laboratorio GI de Douglas - Susan Beasley (770) 920-6346

Laboratorio GI de Kennestone - Laura Friedman (770) 793 - 5864

O bien, llame a nuestro consultorio:

Especialistas en GI de Georgia (678) 741-5000